



Tabulky a vzorce pro AO, kategorie CD (1. a 2. ročník SŠ)

Konstanty a veličiny

Slunce

hmotnost	$M_{\odot} = 1,99 \cdot 10^{30}$ kg
poloměr	$R_{\odot} = 6,96 \cdot 10^8$ m
zářivý výkon	$L_{\odot} = 3,828 \cdot 10^{26}$ W
solární konstanta	$K = 1,36 \cdot 10^3$ W m ⁻²

Čas

juliánský rok	365,25 dne
siderický rok	365,256 36 dne

Velikost a rozměry některých jednotek

astronomická jednotka	$1 \text{ au} = 1,496 \cdot 10^{11}$ m
parsec	$1 \text{ pc} = 3,086 \cdot 10^{16}$ m
standardní atmosféra	$1 \text{ atm} = 101\,325$ Pa

Fyzikální konstanty

rychlosť světla ve vakuu	$c = 2,998 \cdot 10^8$ $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
gravitační konst.	$G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ $\frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$
Hubbleova konst.	$H = 68$ $\frac{\text{km/s}}{\text{Mpc}}$
Stefan–Boltzmannova konst.	$\sigma = 5,670 \cdot 10^{-8}$ $\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4}$
Wienova konstanta	$b = 2,898 \cdot 10^{-3}$ m · K

vizuální hv. velikost	$m_V = -26,74$ mag
bolometrická hv. velikost	$m_{\text{bol}} = -26,83$ mag
absolutní viz. hv. velikost	$M_V = 4,83$ mag
absolutní bol. hv. velikost	$M_{\text{bol}} = 4,74$ mag

tropický rok	365,242 19 dne
--------------------	----------------

elektronvolt	$1 \text{ eV} = 1,602 \cdot 10^{-19}$ J
radián	$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57,3^\circ = 3\,438' = 206\,265''$

Boltzmannova konst.	$k_B = 1,381 \cdot 10^{-23}$ $\frac{\text{J}}{\text{K}}$
ionizační energie vodíku ${}^1\text{H}$	$E_0 = 13,6$ eV
hmotnost protonu	$m_p = 1,673 \cdot 10^{-27}$ kg
hmotnost neutronu	$m_n = 1,675 \cdot 10^{-27}$ kg
hmotnost elektronu	$m_e = 9,109 \cdot 10^{-31}$ kg



Tabulky a vzorce pro AO, kategorie CD (1. a 2. ročník SŠ)

Vzorce

Goniometrické vzorce

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\operatorname{tg} x \operatorname{cotg} x = 1$$

Součtové vzorce

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$\operatorname{tg}(x \pm y) = \frac{\operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y}{1 \mp \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y}$$

$$\operatorname{cotg}(x \pm y) = \frac{\operatorname{cotg} x \operatorname{cotg} y \mp 1}{\operatorname{cotg} x \pm \operatorname{cotg} y}$$

Dvojnásobný úhel

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\operatorname{tg} 2x = \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}$$

Poloviční úhel

$$\sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} \quad \cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$$

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}}$$

(znaménko \pm se určí podle kvadrantu)

Součtové věty

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

Převod přes násobky π

$$\sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \cos x$$

$$\cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \sin x$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \operatorname{cotg} x$$

$$\operatorname{cotg} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \operatorname{tg} x$$

Sinová věta

$$2r = \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

Poměr strany a protilehlého vnitřního úhlu trojúhelníka je konstantní a roven průměru kružnice opsané.

Použití: Známe stranu a 2 úhly u ní nebo 2 strany a úhel jedné z nich (usu, ssu).

Kosinová věta

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

Použití: Známe 3 strany nebo 2 strany a úhel jimi sevřený (sss, sus).

Kvadratická rovnice

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Logaritmy

$$a^y = x \Rightarrow y = \log_a x \quad (\text{pro } x > 0)$$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^c) = c \log_a x$$

$$\log_a x \mapsto \log_b x : \quad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$\log_a a = 1 \quad \log_a 1 = 0 \quad a^{\log_a x} = x$$



Tabulky a vzorce pro AO, kategorie CD (1. a 2. ročník SŠ)

Planety a vybraná tělesa sluneční soustavy

Typ	Název	Kamenné planety		Plynneé planety		Trpasličí planety		Měsíce (znak planety)		
		Rovníkový poloměr [km]	Hmotnost [kg]	Merkur ☀	Venuše ♁	Země δ	Mars σ	Jupiter ♃	Uran ♆	Titan (♅)
	Hlavní poloosa [au]			0,39	$3,302 \times 10^{23}$	2 440	Merkur ☀			
	Oběžná doba [rok]			0,24						
	Sklon rotační osy (k rovině oběhu) [°]			0,034						
	Sklon dráhy k ekliptice [°]			7,01						
	Výstřednost dráhy [-]			0,206						
	Siderická rotace [dny]			58,65						
	Povrchový tlak atmosféry [kPa]			~ 0						
9 200	-243,03	0,007	3,39	2,64	0,62	0,72	$4,8685 \times 10^{24}$	6 052	Venuše ♁	
101,3	1,00	0,017	0	23,439	1,00	1,00	$5,9736 \times 10^{24}$	6 378	Země δ	
0,6	1,03	0,093	1,85	25,19	1,88	1,52	$6,4185 \times 10^{23}$	3 396	Mars σ	
20-200	0,41	0,048	1,30	3,13	11,86	5,2	$1,8996 \times 10^{27}$	71 492	Jupiter ♃	
?	0,44	0,055	2,49	26,73	29,46	9,45	$5,6846 \times 10^{26}$	60 268	Saturn δ	
?	-0,72	0,046	0,77	97,77	84,02	19,22	$8,6810 \times 10^{25}$	25 559	Uran ♆	
?	0,67	0,009	1,77	28,32	164,8	30,11	$1,0243 \times 10^{26}$	24 764	Neptun ψ	
?	0,38	0,08	10,6	4	4,60	2,77	$\sim 9,5 \times 10^{20}$	473	Ceres	
0,001	6,39	0,249	17,14	119,59	248,00	39,54	$1,305 \times 10^{22}$	1 195	Pluto	
?	1,08	0,441	44,04	?	558	67,78	$1,67 \times 10^{22}$	1 163	Eris	
146,7	15,945	0,0288	?	0	15,95 dne	1 221 870 km	$1,3452 \times 10^{23}$	2 575	Titan (♅)	
?	7,154	0,0013	?	0,33	7,155 dne	1 070 400 km	$1,4819 \times 10^{23}$	2 634	Ganymed (♄)	
0,0014	5,876	~ 0	129,8	0	-5,876 dne	354 760 km	$2,14 \times 10^{22}$	1 353	Triton (♃)	
~ 0	27,322	0,055	5,15	6,687	29,53 dne	384 400 km	$7,3477 \times 10^{22}$	1 738	Měsíc (δ)	